

# Bora 30<sup>®</sup>

Nectarina de  
carne amarilla

*frutimida*



|         | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio |
|---------|-------|---------|-------|-------|------|-------|
| Bora 20 |       |         |       |       |      |       |
| Bora 30 |       |         |       |       |      |       |

| Tipología | Color carne | Gusto    | Sobre color rojo (%) | Inicio floración (semana) | Inicio maduración (semana) | Necesidades de frío (Porciones) |
|-----------|-------------|----------|----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Nectarina | Amarilla    | Subácido | 95                   | 2ª febrero                | 4ª mayo                    | 30,75                           |

| Peso (g) | Calibre (mm) | Categoría | Dureza (kg/cm <sup>2</sup> ) | °Brix | Acidez (meq/l málico) |
|----------|--------------|-----------|------------------------------|-------|-----------------------|
| 165      | 69           | A         | 4,2                          | 14,6  | 4,3                   |

Las fechas y datos promedio están referidos a la Finca experimental localizada en La Hoya del Campo (Murcia, España) a 173 m de altitud. Esta información puede variar dependiendo de las condiciones climáticas del año y de las técnicas de cultivo.

Estas variedades están registradas y sólo pueden ser multiplicadas por los viveros autorizados por el IMIDA. Más información de las variedades, de los viveros multiplicadores y licenciados para su venta en [www.imida.es](http://www.imida.es)

Floración

Recolección